

2か月になったら
始めましょう♪♪

柏崎市 乳幼児の予防接種スケジュール一例

2022.4~

子育て支援課家庭支援係


	ワクチン名	生 不活化	定期 任意	年齢												注意事項								
				誕生	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月		1歳~ 1歳 5か月	1歳 6か月~ 11か月	2歳	3歳				
公 費 助 成	ロタウイルス	生	定期			①	②	③	④	※出生6週0日から出生14週6日までに初回接種を行うこと												生後6週から接種可。2種類のワクチンがあり、どちらも接種できる期間が短いので注意！接種間隔は4週間		
	ヒブ (Hib)	不活化	定期			①	②	③											④	①~③は27日以上、標準的には56日までの間隔をおいて接種 ・接種開始が遅れた場合や接種間隔が大きくあいた場合、接種回数が異なるので要相談！ ・公費助成は5歳未満まで				
	小児用肺炎球菌	不活化	定期			①	②	③											④	①は生後2月以降、②は①の接種から27日以上、③は①の接種から139日以上の間隔をあげる ・公費助成は1歳誕生日の前日まで				
	B型肝炎	不活化	定期			①	②		③											④	①~③は20日以上、標準的には56日までの間隔をおいて接種 ・公費助成は7歳半未満まで			
	4種混合 (DPT-IPV)	不活化	定期				①	②	③											④	①~③は20日以上、標準的には56日までの間隔をおいて接種 ・公費助成は7歳半未満まで			
	BCG (結核)	生	定期							①											①	・公費助成は1歳誕生日の前日まで ・標準的な接種期間は生後5~8か月の頃		
	MRワクチン (麻しん風しん混合ワクチン)	生	定期																		①	・公費助成は1歳~2歳未満まで ・2回目の接種は小学校入学前の1年間(年長児のとき)		
	水痘 (みずぼうそう)	生	定期																		①	②	①②は3か月以上(標準的には6か月~12か月)の間隔をおいて接種 ・公費助成は1歳~3歳未満	
	日本脳炎	不活化	定期																			①	①	1期は3歳から...6日以上、標準的には28日までの間隔をおいて2回接種し、1年後に1回追加接種 ・2期は9歳時に1回接種
自己負担	おたふくかぜ	生	任意																				※1歳から接種	2回の接種により発症予防効果が高くなる。追加接種は1回目接種から3~4年後が有効
	インフルエンザ	不活化	任意																					※生後6か月~13歳未満は2~4週間隔をあげ、2回接種

生 : 生ワクチン
不活化 : 不活化ワクチン

※【異なるワクチンの接種間隔の見直しについて】
定期接種実施要領の改正に伴い、令和2年10月1日から接種間隔の一部が見直されることとなりました。
すくすくネットかしわざきのQRコードから確認できます。



定期 : 無料(県外で定期予防接種を実施した場合は自己負担。ただし、償還払制度あり)
任意 : 有料(自己負担) ※任意接種の費用については、かかりつけの医療機関にお問い合わせください。
■ : 定期予防接種の接種推奨年齢
■ : 定期予防接種の接種可能年齢
□ : 任意予防接種の接種可能年齢



柏崎市 LINE公式アカウント

友だち追加



予防接種を公費助成(無料)で受けられる期間の終了が近づいたら、お知らせします。